

کیسول لاغری ریداکتیل 15 میلی گرم 28 عددی

تماس	آرش یزدانی
اسم:	آرش یزدانی
آدرس ایمیل:	09120399138arash@gmail.com
نام:	آرش
نام خانوادگی:	یزدانی
کشور:	ایران
شهر:	تهران
آدرس:	ارسال به تمام نقاط ایران
تلفن:	(912) 399-138
تلفن همراه:	09120399138
ایمیل آدرس:	09120399138arash@gmail.com
شناسه صنفی:	زیبائی و سلامتی



مشخصات آگهی

کد آگهی: RF194612

اطلاعات تکمیلی

عنوان آگهی:
متن آگهی:

کیسول لاغری ریداکتیل 15 میلی گرم 28 عددی
تماس به ما به نفع شماست : 09120399138
قرص لاغری Reductil ریداکتیل، قرصی ضد اشتها یا کم کننده اشتها می باشد که علاقه به خوردن را کاهش می دهد.
قرص لاغری ریداکتیل برای افرادی که استرس و اضطراب در پور خوری آنها تاثیر بالایی دارد گزینه عالی میباشد.
ماده تشکیل دهنده سیبوترامین و هیدروکلراید می باشد.
سیبوترامین و هیدروکلراید با مهار بازجذب نوراپی نفرین و سروتونین و به مقدار کمتر دوپامین در مغز، باعث کاهش اشتها می شود.
قرص ریداکتیل در کاهش وزن افرادی که قادر به گرفتن رژیم های غذایی کم کالری و ورزش نیستند بسیار موثر می باشد.
ریداکتیل به شما کمک میکند که با مصرف غذای کمتر احساس بهتری داشته باشید و به عبارتی میزان غذای مصرفی شما را کنترل میکند این دارو کمک میکند که با مصرف غذای کمتری نسبت به قبل احساس سیری کنید در صورتی که در حالت عادی با مصرف همان میزان غذا همچنان احساس گرسنگی دارید. ریداکتیل این کار را از طریق تغییر در میزان دو ماده شیمیایی موجود در مغز انجام میدهد که این دو ماده سروتونین و نور آدرنالین نام دارند.

موارد منع مصرف ریداکتیل :

1- در صورت داشتن هرگونه سابقه بیماری قلبی جدا از مصرف آن خودداری کنید. حمله قلبی، سکته مغزی، آنژین، نارسایی قلبی

(نارسایی قلبی همراه با تنگی نفس و تورم پا یا ساق پا به علت جمع شدن آب میانبافتی در آن)، ضربان قلب نامنظم (آریتمی)، سخت شدن جدار عروق داشتن فشار خون بالا - بیش از 145 میلی متر جیوه (فشار خون سیستولی) و 90 میلی متر جیوه (فشار خون دیاستولی)
2- سن بالای 65 سال و پایین 18 سال
3- داشتن سابقه آلرژی
4- داشتن قصد حاملگی، دوران شیر دهی

منع مصرف ریداکتیل همزمان با مصرف یکی از داروهای زیر :

- 1- داروهای ضد افسردگی
- 2- سایر داروهای کاهش وزن (شامل داروهای بدون نسخه و داروهای گیاهی)
- 3- هر دارویی که روی سطح هوشیاری تاثیر بگذارد. (مثلا سبب خواب آلودگی شود یا اینکه شما را بی خواب کند) داروهای مثل آرام بخشها، ضد افسردگی ها، تریپتوفان

دستور مصرف داروی ریداکتیل :

روز معمول : یک کپسول یکبار در روز
نحوه مصرف : بلعیدن یک کپسول همراه با یک لیوان آب
ریداکتیل را سر ساعت مصرف کنید. (هر روز در ساعت مشخصی)
بهتر است قبل از غذا (صبحانه گزینه بهتریست)
مهم نیست که کپسول ریداکتیل را قبل از غذا مصرف کنید یا بعد از آن. در صورتی که فراموش کردید دارو را سر موقع مصرف کنید به محض یادآوری آنرا مصرف کنید مگر اینکه تا زمان مصرف دوز بعدی وقت زیادی باقی نمانده بود.
از دو برابر کردن دوز بعدی جدا خودداری کنید.
نمونه تقلبی این قرص با قیمت بسیار ارزان تر در بازارها توسط افراد سودجو توزیع میگردد. مراقب باشید...

برخی از امکانات و قابلیتها:

محصول کشور آلمان
کپسول 15 میلی گرمی ریداکتیل اصل
درمان پرخوری و کاهش اشتها، کنترل اشتها کاذب
دارای تاییدی CE اروپا و FDA امریکا
دارای معتبرترین استانداردهای جهانی ISO,CE,FDA
Sibutramine Hydrochloride Monhydrate

سبوترامین هیدروکلراید
ریداکتیل سبوترامین هیدروکلراید

دوره درمان: 16 هفته (به مدت 8 هفته Reductil 10 میلی گرم، 8 هفته Reductil 15 میلی گرم)

معیارهای ارزیابی کارایی :

ریداکتیل که در سال 1997 مورد تایید اداره نظارت بر غذا و دارو امریکا قرار گرفت. از طریق اثر بر مرکز اشتها که هیپوتالاموس واقع است. باعث کم خوراکی شده و موجب لاغری می گردد. در یک بررسی 12 ماهه، میانگین کاهش وزن در بیمارانی که از کپسول سیبوترامین 10 میلی گرمی استفاده می کردند، در حدود 4/5 کیلوگرم در افرادی که از دوز 15 میلی گرمی استفاده می کردند، در حدود 6 کیلوگرم بود. در حالی که میانگین کاهش وزن در افرادی که فقط از رژیم کم کالری استفاده می کردند، 5/1 کیلوگرم بود. سیبوترامین هیدروکلراید

کارایی:

اثر بخشی با توجه به weightloss : وزن بدن، شاخص توده بدن ران، کمر دور، (BMI)

کاهش وزن بدن درصدی از بیماران یافته شد به دنبال زیر است :

سیبوترامین / Delmuno : 66.7%

سیبوترامین / COMP zok Toprol : 42.9%

از سیبوترامین / Tarka : 54.8%

دارونما / Delmuno : 17.2%

دارونما / COMP zok Toprol : 10.0%

دارونما / Tarka : 16.7%

54.7% از بیماران مبتلا به سیبوترامین و 14.5% از بیماران

دریافت کننده پلاسبو به کاهش وزن بدن 5%

و کاهش وزن بدن 10% مشاهده شد چند درصد از بیماران به مصرف ریداکتیل.

درجه سیبوترامین: 16.3%

درجه دارونما 1.2% (P = 0.0006) .

تغییر، تعدیل در شاخص توده بدن (BMI) بود :

• سیبوترامین : -1.99 ± 0.15 با m²/kg (N = 86)

• دارونما : -0.52 ± 0.16 با m²/kg

رضایت توجه weightloss (بیماران مبتلا به سیبوترامین: = 55،

دارونما = N 51 نفر نفر):

تفاوت قابل توجهی به نفع سیبوترامین با توجه به رضایت از درمان کاهش وزن

میکنند مصرف داروها سایر از که بیمارانی نسبت (P = 0.0107).

"بسیار" و به "شدت" راضی است که 68.5%

در گروه سیبوترامین و 43.5% در سایر داروها

• بیماریهای دستگاه گوارش و تحت سلطه

• بیوست و خشکی دهان

• بیماری های دستگاه تنفسی ، قفسه سینه و مדיاستن ، تحت سلطه
سرفه

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد درمان سیبوترامین صرف
نظر از درمان ضد فشار خون استر اثری منجر به از دست دادن وزن
بالاتر از درمان با سایر داروها
بر اساس رژیم در حمایت از کاهش وزن و اعمال و سوخت و ساز
همزمان
تغییرات ناشی از سیبوترامین در بیماران چاق بهبود در مارکرهای
شکم
از دست دادن چربی در دور کمر و نسبت دور کمر به دور لگن
مشاهده میشود.

سیبوترامین، عوارض جانبی معمولی نظیر خشکی دهان، سردرد،
یبوست و بی خوابی را هم به همراه دارد و از آنجایی که موجب
افزایش فشار خون جزئی می شود، برای افراد مبتلا به فشار خون
توصیه نمی گردد. به طور کلی مصرف این دارو در افرادی که
سابقه بیماری قلبی، بیماری کلیوی، کبدی، سنگ کیسه صفرا، بیماری
های غده تیروئید و آب سیاه هستند، نیز توصیه نمی گردد. خانم های
باردار و شیرده و بچه های زیر 16 سال و افراد بالای 65 سال هم
نباید از این داروی لاغری استفاده کنند.

تماس به ما به نفع شماست : 09120399138

تهران

تهران

استان ::

شهر ::

ارزش

تماس بگیرید

نحوه فروش: